



Escola Seat

Passatge d'Antonio Ruiz Villalba, 6 08038 Barcelona
Tel. 93 332 93 46 Fax 93 422 25 88
escolaseat@xtec.cat <http://www.escolaseat.cat>

Autorització per a l'administració de paracetamol

Dades personals

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l'alumne/a

Relació amb l'alumne/a

Pare Mare Tutor/a

Nom i cognoms de l'alumne/a

Nivell educatiu de l'alumne/a

Dades del centre

Nom

Escola Seat

Autoritzo

El centre educatiu a administrar la **dosi** de _____ paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre superior a 38°C de temperatura corporal mentre s'espera l'arribada d'algun familiar que el pugui portar a casa.

Lloc i data

Signatura del pare, mare o tutor/a de l'alumne/a

Recomanacions per a l'administració del paracetamol als infants a les escoles

Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l'autorització del pare, mare o tutor, que s'ha de demanar en el moment de matriculació de l'alumnat.

La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37 °C que sovint s'acompanya de malestar. És molt freqüent en l'infant. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l'organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarrifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets.

Davant d'un infant amb febre de 38 °C o més l'escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.

Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 °C es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d'efectes secundaris.

Encara que no es tracti d'una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l'escola fins que finalitzi la jornada escolar.

Recomanacions elaborades per la **Societat Catalana de Pediatria** i pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Escola Seat

Passatge d'Antonio Ruiz Villalba, 6 08038 Barcelona
Tel. 93 332 93 46 Fax 93 422 25 88
escolaseat@xtec.cat <http://www.escolaseat.cat>

Autoritzación para la administración de paracetamol

Datos personales

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a del alumno/a

Relación con el alumno/a

Padre Madre Tutor/a

Nombre y apellidos del alumno/a

Nivel educativo del alumno/a

Datos del centro

Nombre

Escuela Seat

Autorizo

Al centro educativo a administrar la **dosis** de _____ paracetamol a mi hijo/a, en caso de presentar fiebre superior a 38°C de temperatura corporal mientras se espera la llegada de algún familiar que le pueda llevar a casa.

Lugar y fecha

Firma del padre, madre o tutor/a del alumno/a

Recomendaciones para la administración del paracetamol al alumnado de las escuelas

Para administrar el paracetamol al alumnado en las escuelas, es necesario tener la autorización del padre, madre o tutor, que se tiene que pedir en el momento de matriculación del alumnado.

La fiebre es un síntoma caracterizado por un aumento de temperatura por sobre de 37 °C que a menudo se acompaña de malestar. Es muy frecuente en el/la niño/a. La fiebre es en sí misma un mecanismo de defensa del organismo contra la enfermedad y, por tanto, no es necesario tratarla de forma inmediata con medicamentos. Podemos utilizar medidas físicas para hacer bajar la temperatura y disminuir las molestias: si tiene malestar, frío o escalofríos se recomienda no abrigarlo y darle agua a sorbitos.

Delante de un/a niño/a con fiebre de 38 °C o más, la escuela ha de contactar con el padre, madre o tutor y pedirle que le recoja tan pronto como pueda.

Mientras tanto, si la fiebre es igual o superior a 38 °C, se recomienda administrar un antitérmico/analgésico. El fármaco de referencia y más utilizado en todos los sitios es el paracetamol, por su buena tolerancia y la relativa ausencia de efectos secundarios.

Aunque no se trate de una urgencia, un/a niño/a con fiebre no ha de quedarse en la escuela hasta que finalice la jornada escolar.

Recomendaciones elaboradas por la **Sociedad Catalana de Pediatría** y por el
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.